

Mise en place de jachères florales (JF) ou de jachères tournantes (JT)

Choix de l'emplacement

- Choisir un terrain sans problème de mauvaises herbes (chardons, rumex, chiendents, liserons ou ray-grass);
- Pas de semis après une prairie temporaire, concurrence trop élevée;
- Essayer de connecter les surfaces écologiques entre elles (mise en réseau de biotopes);
- Exclure les terrains humides, à l'ombre, denses, tourbeux ou très riches en azote;
- JF sont semées en bandes linéaires, JT sur des surfaces plus étendues;
- Du fait de leur durée limitée, les JT sont moins exigeantes par rapport au terrain.

Préparation du lit de semence

- Effectuer si possible un labour en automne (attention au risque d'érosion), mais labourer au plus tard un mois avant le semis;



- A la fin de l'hiver, passer la herse-étrille ou le vibroculteur (à env. 10 cm de profondeur) et attendre au minimum 2 semaines;
- Avant le semis, effectuer 2-3 hersages superficiels à 2 semaines d'intervalle;
- Faire un lit bien appuyé, fin et propre (pas trop profond).

Mélanges de semences

- Terrains caillouteux, plutôt secs : mélanges JF et JT;
- Terrains riches, humides ou tourbeux : mélange spécial UFA pour terrains riches.

Période idéale pour le semis

- Préférer un semis au printemps (mi-mars à mi-avril) sur sol bien ressuyé;
- Semis en automne (mi-septembre à mi-octobre) seulement lors de forte pression de plantes problématiques telles que millet, galinsoga ou amarante.

Semis

- Semer directement après le dernier hersage;
- Semer superficiellement avec un semoir ou à la main;
- Respecter la quantité de semence recommandée;



- Ne pas enfouir la semence;
- Passer le rouleau tout de suite après le semis (rouleau non-lisse).

Entretien nécessaire l'année du semis

- Après le semis, il faut être patient, car les plantes des jachères germent très lentement;
- Dans les JF, n'effectuer une coupe de nettoyage que lors de forte pression des mauvaises herbes, dès que la végétation commence à couvrir le sol; la coupe de nettoyage n'est pas autorisée dans les JT;
- Toujours évacuer le produit de la coupe.

Entretien les années suivantes

- Il est important de contrôler régulièrement la présence de plantes problématiques et de les combattre sans attendre;
- Fauches dans les JF : autorisées à partir de la deuxième année sur max. la moitié de la surface entre le 1^{er} octobre et le 15 mars ; à n'effectuer que lors de menace d'embroussaillage;
- Un travail du sol en surface (herse, cultivateur) sur une partie de la surface fauchée peut favoriser la diversité floristique.



Remise en culture

- Labour suivi de plusieurs hersages superficiels;
- Cultures adéquates après une jachère: de préférence des prairies temporaires pluriannuelles, des céréales ou du maïs.